Der dicke Vogel (Adipositas)

Weniger füttern und mehr beschäftigen!

Ein Vogel darf nicht hungern. Dickmacher sind ganz zu streichen oder sehr stark zu reduzieren; zu nennen sind im Besonderen Sonnenblumenkerne, Nüsse, Knabberstangen, Eifutter und Kolbenhirse. Damit der Vogel abnimmt, muss das Körnerfutter reduziert werden. Beispielsweise benötigt ein Wellensittich etwa 1-2 gestrichene Teelöffel Körnerfutter am Tag. Zur Minderung der Energiedichte des Körnerfutters sind auch spezielle Diätfuttermittel mit Grassamen erhältlich.
Die Ernährung sollte den Vögeln Abwechslung bieten. Sinnvoll ist eine mehrmalige Fütterung kleiner Mengen über den Tag verteilt, nicht jede Mahlzeit sollte Körner enthalten. Ein vermehrtes Angebot von Grünfutter oder Gemüse ist sättigend und zugleich auch eine gesunde Beschäftigung. Der Kot wird allerdings durch die Fütterungsumstellung weicher, da die Vögel mit dem Frischfutter mehr Wasser aufnehmen.
Vögel verbringen unter natürlichen Umständen viel Zeit mit der Futtersuche. Eine einfache Beschäftigungsmöglichkeit für die Vögel bietet ein Angebot von verschiedenen Futterstellen. Zusätzlich lässt sich das Futter auch auf vielfältige Weise verstecken. Hier muss jedoch Schritt für Schritt mit dem Vogel geübt werden. Papprollen, Papierkugeln oder ähnliches bieten sich an, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Zusätzlich zum Körnerfutter ist ein Angebot von Grit und Kalk erforderlich. Zudem benötigen sie zahlreiche Vitamine, diese können in Form von Vitaminzusätzen, Grünfutter oder Gemüse angeboten werden. Ein vermehrtes Angebot von Grünfutter oder Gemüse ist sättigend und zugleich auch eine gesunde Beschäftigung. Die Vögel mögen oftmals Vogelmiere, Löwenzahn oder Möhren. Frische Zweige von ungiftigen, ungespritzten heimischen Bäumen (Weide, Haselnuss, Obstbäume) und Sträuchern sind eine ideale Beschäftigungsmöglichkeit, sowohl als Klettermöglichkeit, als auch um sie zu zernagen.
Nach 6 Stunden haben sich auf Obst schon so viele Hefen und Bakterien angesiedelt, dass es nicht länger im Napf belassen werden darf.
Häufiges und abwechslungsreiches Spiel lenken den Vogel vom Fressen ab. Ein Vogel braucht viel Freiflug – unter Aufsicht oder in einem vogelsicheren Zimmer. Fliegt ein Vogel nicht, so muss man ihn je nach Ursache zur Bewegung motivieren. Kann ein zu dicker Vogel nicht fliegen, so muss er langsam trainiert werden. Anfangs sind erste Sprünge und Flatterversuche schon ein Erfolg. Vorsicht aber vor Stürzen!
Zur Überprüfung des Gewichtes ist es günstig den Vogel regelmäßig zu wiegen. Ein Wellensittich sollte beispielsweise maximal 1g pro Woche abnehmen. Ziel ist eine Reduktion um 5-10% des aktuellen Gewichtes pro Monat.

Taubenklinik des Verbandes | Katernberger Str. 115 | 45327 Essen Tel.: (02 01) 84 83 90 | Fax: (02 01) 8 48 39 68 | www.brieftaube.de			
Sprechstunde:			Telefonsprechstunde:
Mo, Do:	9.30 – 12.00 Uhr	15.00 – 19.00 Uhr	14.00 – 15.00 Uhr
Di, Fr:	9.30 – 12.00 Uhr	15.00 – 17.00 Uhr	14.00 – 15.00 Uhr
Mi:	9.30 – 12.00 Uhr		
Sa:	10.00 – 12.00 Uhr		

Taubenklinik des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e.V.
Fachklinik für Vögel aller Art

Anfahrt

Sie finden uns auf dem Gelände des TripleZ in Essen-Katernberg.
Bei älteren Navigationsgeräten bitte Katernberger Str. 107 eingeben.